

RIFAXIMINA

Rifaximina (Normix®)

ATC: A07AA11

Indicazioni registrate:

- Infezioni intestinali acute e croniche sostenute da batteri gram-positivi e gram-negativi; sindromi diarroiche.
- Diarrea da alterato equilibrio della flora microbica intestinale (diarree estive, diarrea del viaggiatore, enterocoliti).
- Profilassi pre e post-operatorie delle complicanze infettive negli interventi di chirurgia del tratto gastroenterico.
- Coadiuvante nella terapia delle iperammoniemie.

Si riporta una tabella con le formulazioni attualmente disponibili:

formulazione	medicinale	DDD (g)	costo/DDD (€)
Rifaximina cpr 200 mg	NORMIX*AD 12CPR RIV 200MG	0,6	2,08
Rifaximina sosp os 2g/100 ml	NORMIX*OS SOSP 60ML 2G/100ML	0,6	2,42

La rifaximina è disponibile in commercio anche nella formulazione cpr da 550 mg (Tixteller®) con indicazione selettiva “per la riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di età ≥ 18 anni”; Tixteller (classe A-PHT, RRL) è prescrivibile dai medici specialisti delle U.O. (degenza - day hospital - ambulatori) di infettivologia, gastroenterologia e medicina interna delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private accreditate.

Rifaximina nella Malattia Diverticolare

In base alle Linee Guida relative a diverticolosi e malattia diverticolare pubblicate dal Sistema Nazionale Linee Guida (aggiornamento: settembre 2022) gli antibiotici non assorbibili non trovano indicazione in assenza di sintomatologia gastro-intestinale. Nella diverticolosi asintomatica (circa l'80% dei casi), gli studi disponibili non supportano l'uso routinario di rifaximina nella prevenzione dei sintomi e dell'infiammazione: in questo contesto vanno considerate le norme dietetico/comportamentali come adeguato apporto di acqua e fibre, controllo del peso, astensione dal fumo.

L'utilizzo di rifaximina al di fuori delle indicazioni della scheda tecnica si configura come un uso off-label e pertanto non è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale.

Si ricordano, in base alle indicazioni (previste in adulti e ragazzi oltre i 12 anni) le posologie consigliate in scheda tecnica:

Trattamento antidiarroico:

200 mg ogni 6 ore

Trattamento pre e post-operatorio:

400 mg ogni 12 ore


Trattamento coadiuvante dell'iperammoniemia:

400 mg ogni 8 ore

Salvo diversa prescrizione medica il trattamento non dovrà superare i 7 giorni

Rifaximina, come tutti gli antimicrobici, necessita di un'attenta valutazione di dosi e durata del trattamento.

Secondo il sistema di classificazione AWARe dell'OMS che suddivide gli antibiotici in 3 categorie "Access" "Watch" "Reserve", la rifaximina appartiene alla categoria Watch.



Bibliografia:

Banca Dati "Gallery" di Farmadati

Linee Guida relative a diverticolosi e malattia diverticolare pubblicate dal Sistema Nazionale Linee Guida (aggiornamento settembre 2022)

The WHO AWARe Antibiotic Book OMS 2022